



Dr. FERNANDO ESCAMEZ ABAD
Médico Especialista en Traumatología
Y Cirugía Ortopédica

PACIENTE:

Fecha intervención:

TIPO CONCRETO DE INTERVENCION:

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

INTERVENCION: TRATAMIENTO QUIRURGICO DE PSEUDOARTROSIS

Usted tiene derecho a conocer el procedimiento al que va a ser sometido y las complicaciones más frecuentes que ocurren. Este documento intenta explicarle todas estas cuestiones; léalo atentamente y consulte con su médico todas las dudas que le se le planteen. Le recordamos que, por imperativo legal, tendrá que firmar, usted o su representante legal, el consentimiento informado para que podamos realizarle dicho procedimiento.

PROCEDIMIENTO

La intervención consiste en resolver el fracaso de consolidación de una fractura a pesar de haber realizado un tratamiento sobre la misma. Esta situación se produce por la falta de eficacia de los mecanismos naturales que son los que, en definitiva consiguen la fusión de los fragmentos óseos fracturados, a pesar que los tratamientos empleados han intentado facilitar esta consolidación

Para intentar solucionar esta patología se va a hacer un desbridamiento del foco de unión fibrosa, se estabilizará el foco con un sistema de osteosíntesis (clavos, placas atornilladas o un sistema de fijación con injerto óseo) y después de aportará material biológico o sustituto para facilitar la consolidación.

El procedimiento habitualmente precisa anestesia general o regional. El servicio de Anestesia estudiará sus características personales, informándole en su caso cual es la más adecuada.

Probablemente será necesaria la administración de la medicación oportuna para reducir la incidencia de dos de las complicaciones principales: aparición de trombosis en las venas o infección después de la operación.

También se realizará tratamiento con antibióticos para prevenir la aparición de infecciones.

CONSECUENCIAS SEGURAS

Durante la operación existe una pérdida de sangre que puede requerir transfusiones sanguíneas. Si quiere una información más detallada en este aspecto deberá solicitarla para que se la proporcione el Hematólogo o el Anestesta.

Después de la intervención presentará molestias en la zona de la operada, debidas a la cirugía y a la adaptación de los músculos de la zona. Estas molestias se pueden prolongar durante algún tiempo o hacerse continuas.

Precisará reposo de la articulación, en cama o bien caminar sin apoyar dicha pierna, según el tipo y la localización de la intervención realizada. Igualmente recibirá instrucciones sobre la rehabilitación a realizar, los movimientos a evitar y como utilizar los bastones.

La fuerza muscular se recupera gradualmente cuando el dolor desaparece.

La intervención no asegura el resultado de consolidación ya que, aunque se pongan todos los medios para conseguir la misma, pueden seguir fracasando los mecanismos naturales de unión ósea.

DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS TÍPICOS

- Toda intervención quirúrgica lleva implícitas una serie de complicaciones comunes y potencialmente serias, que podrían hacer variar la técnica operatoria programada, requerir tratamientos complementarios, tanto médicos como quirúrgicos, así como un mínimo porcentaje de mortalidad.

- Obstrucción venosa con formación de trombos, hinchazón de la pierna correspondiente y en raras ocasiones se complica con dolor torácico y dificultad respiratoria (embolia pulmonar) que puede conducir a la muerte.

- Infección en la zona intervenida: Esta puede ser superficial (se puede resolver con limpieza local y antibióticos) o profunda (generalmente hay que retirar el implante). Dicha complicación puede ocurrir incluso años después de la intervención.

- Lesión de los nervios de la extremidad que puede condicionar una disminución de la sensibilidad o una parálisis. Dicha lesión puede ser temporal o bien definitiva.

